

Paediatric® Montal® 5

Montelukast 5mg (as Montelukast Sodium)



Presentation:

Montal® Paediatric 5: Each chewable tablet contains Montelukast Sodium equivalent to 5 mg Montelukast in packs of 30 tablets. Hospital packs are also available (500 and 1000).
Note: Not all pack sizes are available in all countries.

Excipients: Mannitol, croscarmellose sodium, hydroxypropyl cellulose, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, aspartame, ART cherry flavor, ferric oxide.

Pharmaceutical form:

Cherry flavoured Chewable tablets.

Pharmacotherapeutic group:

Leukotriene receptor antagonist. ATC: R03DC03.

Therapeutic Indications:

- Your doctor has prescribed **Montal® Paediatric** to treat your child's asthma, preventing asthma symptoms during the day and night.
- **Montal® Paediatric** is used for the treatment of patients who are not adequately controlled on their medication and need additional therapy.
- **Montal® Paediatric** may also be used as an alternative treatment to inhaled corticosteroids for 6 to 14 year old patients who have not recently taken oral corticosteroids for their asthma and have shown that they are unable to use inhaled corticosteroids.
- **Montal® Paediatric** also helps prevent the narrowing of airways triggered by exercise.

Your doctor will determine how **Montal® Paediatric** should be used depending on the symptoms and severity of your child's asthma.

Posology and method of administration:

- To be taken by mouth
- You or Your child should take only one tablet of **Montal® Paediatric** once a day as prescribed by your doctor.
- It should be taken even when your child has no symptoms or has an acute asthma attack.
- Always have your child take **Montal® Paediatric** as your doctor has told you. You should check with your child doctor or pharmacist if you are not sure.
- If you or your child is taking **Montal® Paediatric**, be sure that you or your child does not take any other products that contain the same active ingredient, montelukast.

Dosage

For children 6 to 14 years of age: One **Montal® Paediatric** 5 mg chewable tablet daily to be taken in the evening. **Montal® Paediatric** 5 mg chewable tablets should not be taken immediately with food; it should be taken at least 1 hour before or 2 hours after food.

Forgotten dose: Try to take **Montal® Paediatric** as prescribed. However, if you miss a dose, just resume the usual schedule of one tablet once daily. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

Stopped treatment: **Montal® Paediatric** can treat your child's asthma only if your child continue to take it.

It is important for child to continue taking **Montal® Paediatric** for as long as your doctor prescribes. It will help control your child asthma.

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.

Contra-indications:

If you are allergic (hypersensitive) to montelukast or any of the excipients.

Warnings and Precautions for use:

- If you or your child's asthma or breathing gets worse, tell your doctor immediately.
- Oral Montelukast is not meant to treat acute asthma attacks. If an attack occurs, follow the instructions your doctor has given you. Always have your inhaled rescue medicine for asthma attacks with you.
- It is important that your child take all asthma medications prescribed by your doctor. **Montal® Paediatric** should not be substituted for other asthma medications your doctor has prescribed for you or your child.
- Any patient on anti-asthma medicines should be aware that if he/she develop a combination of symptoms such as a flu-like illness, pins and needles or numbness of arms or legs, worsening of pulmonary symptoms, and/or rash, you should consult your doctor.
- You or your child should not take acetyl-salicylic acid (aspirin) or anti-inflammatory medicines (also known as non-steroidal anti-inflammatory drugs or NSAIDs) if they make your asthma worse.
- Use in Children: for 2 - 5 years old, **Montal® Paediatric** 4 mg chewable tablets are available.

Taking with food and drink: **Montal® Paediatric** chewable tablets should not be taken immediately with food; it should be taken at least 1 hour before or two hours after food.

Driving and using machines: **Montal® Paediatric** is not expected to affect your ability to drive a car or operate machinery. However, individual responses to medication may vary. Certain side effects (such as dizziness and drowsiness) that have been reported very rarely with **Montal® Paediatric** may affect some patients' ability to drive or operate machinery.

Important information about some of the ingredients of Montal® Paediatric:

Montal® Paediatric chewable tablets contain aspartame, a source of phenylalanine. If your child has phenylketonuria you should take this into account.

Use During Pregnancy and Lactation:

Women who are pregnant or intend to become pregnant should consult their doctor before taking Montelukast. Your doctor will assess whether you can take **Montal® Paediatric** during this time.

Lactation: It is not known if Montelukast appears in breast milk. You should consult your doctor before taking **Montal® Paediatric** if you are breast-feeding or intend to breast-feed.

Drug Interactions:

Some medicines may affect how Montelukast works, or Montelukast may affect how your child's other medicines work.

Please tell your doctor or pharmacist if your child are taking or have recently taken other medicines, including those obtained without a prescription.

Tell your doctor if your child is taking the following medicines before starting

Montal® Paediatric:

- Phenobarbital & Phenytoin (used for treatment of epilepsy).
- Rifampicin (used to treat tuberculosis and some other infections).

Undesirable effects:

Like all medicines, Montelukast can cause side effects, although not everybody gets them.

In clinical studies with Montelukast, the most commonly reported side effects (occurring in at least 1 of 100 patients and less than 1 of 10 patients treated) thought to be related to Montelukast were: headache

Additionally, the following side effect was reported in clinical studies with Montelukast 10 mg film coated tablets: abdominal pain.

These were usually mild and occurred at a greater frequency in patients treated with Montelukast than placebo (a pill containing no medication).

The frequency of possible side effects listed below is defined using the following convention: Very common (affects at least 1 user in 10). Common (affects 1 to 10 users in 100). Uncommon (affects 1 to 10 users in 1,000). Rare (affects 1 to 10 users in 10,000). Very rare (affects less than 1 user in 10,000). Additionally, while the medicine has been on the market, the following have been reported:

- Upper respiratory infection (Very common)
- Increased bleeding tendency (Rare)
- Allergic reactions including rash, swelling of the face, lips, tongue, and/or throat which may cause difficulty in breathing or swallowing (Uncommon)
- Serious behavior and mood-related changes include suicidal thoughts and actions.
- Behavior and mood related changes [dream abnormalities, including nightmares, trouble sleeping, sleep walking, irritability, feeling anxious, restlessness, agitation including aggressive behavior or hostility, depression (Uncommon); tremor (Rare); hallucinations, suicidal thoughts and actions (Very rare)]
- Dizziness, drowsiness, pins and needles/numbness, seizure (Uncommon).
- Palpitations (Rare).
- Nosebleed (Uncommon).
- Diarrhea, nausea, vomiting (Common); dry mouth, indigestion (Uncommon).
- Hepatitis (inflammation of the liver) (Very rare).
- Bruising, itching, hives (Uncommon); tender red lumps under the skin most commonly on your shins (erythema nodosum) (Very rare).
- Joint or muscle pain, muscle cramps (Uncommon).
- Fever (Common); tiredness, feeling unwell, swelling (Uncommon).

In asthmatic patients treated with montelukast, very rare cases of a combination of symptoms such as flu-like illness, pins and needles or numbness of arms and legs, worsening of pulmonary symptoms and/or rash (Churg-Strauss syndrome) have been reported. You must tell your child doctor right away if you get one or more of these symptoms.

Stuttering (Dysphemia) and obsessive-compulsive symptoms as very rare potential neuropsychiatric adverse events.

Ask your doctor or pharmacist for more information about side effects. If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your child doctor or pharmacist.

Reporting of suspected adverse reactions

Tel: 06-5632000

Website: www.jfda.jo

Smart phones application: Jordan fda

Paper reporting form: yellow card

Overdose:

Contact your child immediately for advice.

There were no side effects reported in the majority of overdose reports. The most frequently occurring symptoms reported with overdose in adults and children included abdominal pain, sleepiness, thirst, headache, vomiting, and hyperactivity.

Pharmacological Properties:

Pharmacodynamic properties

Montal® Paediatric (Montelukast Sodium) is a leukotriene receptor antagonist that blocks substances called leukotrienes. Leukotrienes cause narrowing and swelling of airways in the lungs and also cause allergy symptoms. By blocking leukotrienes, **Montal® Paediatric** improves asthma symptoms, helps control asthma and improves seasonal allergy symptoms (also known as hay fever or seasonal allergic rhinitis).

Pharmacokinetic properties

Absorption: Montelukast is rapidly absorbed following oral administration.

Distribution: Montelukast is more than 99% bound to plasma proteins. The steady-state volume of distribution of Montelukast averages 8-11 liters.

Elimination: The plasma clearance of Montelukast averages 45 ml/min in healthy adults. Montelukast and its metabolites are excreted almost exclusively via the bile.

Special precautions for storage:

Do not store above 30°C.

This is a medicament

- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep medicament out of the reach of children.

COUNCIL OF ARAB HEALTH MINISTERS
UNION OF ARAB PHARMACISTS

Al-Taqaddom Pharmaceutical Industries
Amman-Jordan

T3 PHARMA
Total Quality
www.t3pharma.com

June , 2020
I-0107-MTL-LMO-R3/A/E

مونتال

مونتالوكاست ٥ ملم(على شكل مونتالوكاست صوديوم)

كيفية التزويد،

مونتال ٥ ملم، كل قرص قابل للمضغ يحتوي على مونتالوكاست صوديوم ما يعادل ٥ ملمغ مونتالوكاست في عبوة سعة ٣٠ قرص.
عبوات المستشفيات متوفرة أيضاً (٥٠٠ و ١٠٠٠).
ملاحظة: لا تتوفر جميع أحجام العبوات في جميع البلدان.
السواغات: مانيتول، كروسكاراميلوز صوديوم، سيلولوز هيدروكسيل بربيل، مايكروكريستالين سيلولوز، سترات المغنيسيوم، اسبارتام، نكهة الكرز الاصطناعية، أكسيد الحديد.

الشكل الصيدلاني،

أقراص قابلة للمضغ بطعم الكرز.

المجموعة العلاجية،

مضاد استنشقات ليكورتراين؛ التصنيف العلاجي: R03DC03

الاستخدامات،

يصف الأطباء **مونتال** **للاطفال** لمعالجة ربو طفلك و الوقاية من حدوث أعراضه أثناء النهار و الليل.
يستعمل **مونتال** **للاطفال** لعلاج المرضى تصعب لديهم السيطرة على الربو - بدرجة كافية - بواسطة العلاج الاعلاج بنشأتونه و بالتالي يحتاجون إلى علاج إضافي.
يستعمل **مونتال** **للاطفال** أحياناً كعلاج بديل للكورتيكوستيرويدات المستنشقة عند الاطفال الذين تراوح أعمارهم بين ١-١٥ سنة على أن لا يكونوا قد تناولوا أي كورتيكوستيرويدات هيمية حديثاً و ثبت أنهم غير قادرين على استعمال الكورتيكوستيرويدات المستنشقة.
يساعد **مونتال** **للاطفال** في منع تضيق الممرات الهوائية الناتج عن بذل مجهود عضلي في الاطفال الأكبر من سنتين.

يحدد الطبيب المآالج كيفية استعمال **مونتال** **للاطفال** حسب الأعراض وشدة الربو.

الجرعة وطريقة تناول الدواء،

تؤخذ عن طريق الفم.
يجب إعطاء هذا الدواء للاطفال ولكن تحت مراقبة البالغين.
يجب تناوله في حالة عدم وجود أعراض للربو أو إذا كنت تعاني من نوبة حادة من الربو على حد سواء.
تناول مونتال **للاطفال** دائماً كما وصفه لك الطبيب. إذا كنت غير واثق من طريقة تناول **مونتال** يجب أن تستشير الطبيب المآالج أو الصيدلي.
إذا كنت تتناول **مونتال** **للاطفال** تأكد من أنك لا تتناول أو تملك أي منتجات وادوية أخرى تحتوي على نفس المادة الفعالة، مونتالوكاست.

الجرعة

للاطفال من ٦-١٥ سنة: قرص واحد من أقراص **مونتال** **للاطفال** ٥ ملمغ القابلة للمضغ يومياً في المساء، لا يجب تناول أقراص **مونتال** **للاطفال** القابلة للمضغ مباشرة مع الطعام؛ يجب تناوله أما قبل الطعام بساعة على الأقل أو بعد تناوله بساعتين.
الجرعة المنسقة: حاول أن تتزم بتناول **مونتال** **للاطفال** كما وصفه لك الطبيب. ولكن إذا نسيت تناول جرعة، تناول قرص واحد مرة واحدة يومياً كالمعتاد و لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

التوقف عن العلاج: يمكن أن يبالغ **مونتال** **للاطفال** الربو لديك فقط إذا تم تناوله باستمرار. من المهم أن تستمر في تناول **مونتال** **للاطفال** طيلة الفترة الزمنية التي يحددها لك الطبيب المآالج، لأن ذلك يساعد في السيطرة على مرض الربو لديك.
إذا كانت لديك أية أسئلة أو أخرى حول استعمال **مونتال** **للاطفال**، يمكنك أن تسأل الطبيب أو الصيدلي.

موانع الاستخدامات،

إذا كنت مصاباً بنزط الحساسية مادة مونتالوكاست أو لأي من السواغات .

تحذيرات واحتياطات خاصة بالاستعمال،

أخطر طبيبك عن أية مشكلات طبية أو حالات فرط حساسية تعاني منها في الفترة الحالية أو عانيت منها سابقاً.
• إذا ساءت أعراض الربو أو الصعوبة في التنفس لديك، ف عليك إبلاغ الطبيب فوراً.
• إن أقراص مونتالوكاست الفموية لاستعمل لمعالجة نوبات الربو الحادة. إذا تعرضت لنوبة الربو، ف عليك اتباع تعليمات الطبيب. عليك أن تصطحب معك دائماً العلاج الاستنشاق الذي تستخدمه للسيطرة على نوبات الربو.
• من المهم أن تتناول أو تملك كل الأدوية المآالجة للربو الموصوفة من قبل الطبيب. كما يجب أن لا تستبدل العلاجات الموصوفة لك أو تملك **مونتال** **للاطفال**.
• إن أي مريض يتناول أدوية مضادة للربو، يجب أن يمي أنه في حالة حدوث أي مزيج من الأعراض مثل الأعراض الشبيهة بالانفلونزا، الشعور بما يشبه وخز الدبابيس أو الإبر أو تيميل بالذراعين أو الساقين، ظهور الأعراض التنفسية) أو طفح جلدي، فإنه يجب عليه استشارة الطبيب.
• يجب تجنب تناول حمض أسيتيل ساليسيليك (الأسبرين) أو الأدوية المضادة للالتهاب (مضادات الالتهاب اللاستيرويدية) إذا تسببت في تدهور حالة الربو لديك.
• **استعماله** في ٢-٥ سنوات، متوفر أقراص **مونتال** **للاطفال** ٥ ملمغ القابلة للمضغ.
• **تأثيره على الغذاء والشرب:** يجب عدم تناول أقراص **مونتال** **للاطفال** القابلة للمضغ مباشرة مع الطعام؛ يجب تناولها أما قبل الطعام بساعة على الأقل أو بعد تناوله بساعتين.
القيادة والتشغيل الآلات: هذه الجرعة غير قابلة للتطبيق بالنسبة لأقراص **مونتال** **للاطفال** القابلة للمضغ حيث أنه بعد لاستعماله في الاطفال الذين تراوح أعمارهم بين ٦-١٥ سنة، ومع ذلك فإن المعلومات المتعلقة بتأثيره بآثاره الفعالة، مونتالوكاست. ليس من المتوقع أن يؤثر **مونتال** **للاطفال** على قدرتك على قيادة السيارة أو تشغيل الآلات. ومع ذلك، فإن الاستجابات الفردية للدواء قد تختلف، إن بعض الآثار الجانبية (مثل الدوار والتعاس) التي تم تسجيل حدوثها بشكل نادر جدا مع استعمال **مونتال** **للاطفال** قد تؤثر على قدرة بعض المرضى على القيادة وتشغيل الآلات.
معلومات هامة عن بعض مكوّنات أقراص مونتال **للاطفال**:
أقراص **مونتال** **للاطفال** القابلة للمضغ تحتوي على الأسبارتام وهو مصدر للفينيل ألانين. إذا كان طفلك يعاني من المرض الفينيل كيتونيوريا فيجب أخذ هذا المكون في الاعتبار.

الاستعمال خلال فترة الحمل والرضاعة،

يجب على النساء الحوامل أو اللاتي يربين الرضعا أن يستشرن الطبيب. سيقيم الطبيب بتقييم مدى إمكانية تناولك **مونتال** **للاطفال** أثناء تلك الفترة.
البيضاء: ليس من المعروف ما إذا كان مونتالوكاست يظهر في حليب الأم المرضعة. لذلك يجب أن استشارة الطبيب قبل تناول مونتالوكاست إذا كنت ترضعين طفلك أو توين إرضاعه رضاعة طبيعية.

التداخلات الدوائية،

بعض الأدوية قد تؤثر على آلية عمل مونتالوكاست أو قد يؤثر مونتالوكاست على كيفية عمل الأدوية الأخرى.
يرجى إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول حالياً أو تناولت مؤخراً أية أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. قبل البدء بتناول مونتالوكاست، عليك أن تعلم الطبيب

- معالج إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية التالية:
- فينوباريتال، فينتينين (يستعمل لعلاج الصرع).
- ريفامبيسين (يستعمل لعلاج السل الرئوي وبعض أنواع العدوى الأخرى).

الآثار الجانبية غيرالمعروف فيها،

كما هو الحال مع جميع الأدوية، فإن مونتالوكاست يمكن أن يسبب آثاراً جانبية على الرغم من أن تلك الآثار قد لا تحدث لكل من يتناوله.
في الدراسات السريرية التي تناولت أقراص مونتيلوكاست، كانت أكثر الآثار الجانبية التي يعتقد ارتباطها ببدء الدواء (شعباً (حدثت في أكثر من واحد من كل مائة مريض وأقل من واحد من كل عشرة) هي: ألم بالبلغم والمعلش.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الآثار الجانبية التالية تم مشاهدتها في الدراسات السريرية التي تناولت أقراص مونتيلوكاست ١٠ ملمغ المغلفة، مساع:
كانت هذه الآثار بسيطة في العادة وقد كانت معدلات حدوثها أعلى في المرضى الذين تناولوا أقراص مونتيلوكاست مقارنة بأولئك الذين تناولوا عقاراً وهمياً (قرص لا يحتوي على أي دواء).
لقد تم تعريف معدلات حدوث الآثار الجانبية المحتملة الواردة أدناه باستخدام الاصطلاحات التالية:
شائع جداً (يصيب مريض واحد على الأقل من بين كل ١٠). شائع (يصيب ما يتراوح من ١ إلى ١٠ من بين كل ١٠٠ مريض). غير شائع (يصيب ما يتراوح من ١ إلى ١٠ من بين كل ١٠٠٠ مريض). نادر (يصيب ما يتراوح من ١ إلى ١٠ من بين كل ١٠٠٠٠ مريض). نادر جداً (يصيب أقل من ١ من بين كل ١٠٠٠٠ مريض).
إضافة إلى ذلك، فإنه عندما تم صرف مونتيلوكاست في الأسواق، تم تسجيل حدوث الآثار الجانبية التالية:
التهاب باجزء العلوي من الجهاز التنفسي (شائع جداً).
زيادة القابلية للحساسية (نادر).
تفاعلات تحسسية طمع جلدي، وتورم الوجه والشفتيين واللسان و/ أو الحلق مما قد يسبب صعوبة في التنفس أو اليلع (غير شائع).
تغيرات سلوكية ومزاجية خطيرة تتضمن التفكير في الانتحار والإقدام عليه.
تغيرات سلوكية ومزاجية (اضطرابات في الأحلام، وتشمل الأحلام المرعبة، النوم القلق، المشي أثناء النوم، القابلية للإثارة، الضغوط بالقلق، الضجر، الإسهال ويشمل السلوك العنيف أو العدوانية، الاكتئاب (غير شائع)؛ وشعة (نادر): الهوس، التفكير في الانتحار والإقدام عليه (نادر جداً))
الدوار والتعاس والإحساس بما يشبه وخز الدبابيس والإبر/ التيميل والتشنجات (غير شائع، الخفقان (نادر).
نزيف الأنف (غير شائع).
إسهال، خثان، قئ (شائع)؛ جفاف الفم، عسر الهضم (غير شائع).
التهاب الكبد (نادر جداً).
تكم، حكة جلدية، ظهور بثور (غير شائع)؛ كل حمراء مؤلمة حال الضغط عليها تظهر تحت الجلد وغالباً ما تظهر على مقدمة الساق، الحماحي الغدية (نادر جداً).
آلام بالمفاصل أو العضلات، وتقلصات عضلية (غير شائع).
الحمى (شائع) والإجهاد والشعور بالتعب والتورم (غير شائع).
في المرضى الحاصلين بالربو والذين يعانون باستعمال مونتيلوكاست، وردت تقارير تفيد أن حالات نادرة جدا قد تعرض لمزيج من الأعراض مثل أعراض تشبه الانفلونزا أو الإحساس بما يشبه وخز الدبابيس والإبر أو التيميل في الذراعين والساقين، تدهور الأعراض الرئوية و/ أو طفح جلدي (متلازمة شرج- ستروس). يجب عليك أن تعلم الطبيب فوراً إذا ظهر لديك واحد أو أكثر من هذه الأعراض.
حدثت ضعف في الكلام (التأتأة) والأعراض الفموية المفردة، حيث تعتبر من الآثار الجانبية التنفسية الصعبة الانتادرة جدا.

يمكنك أن تسأل الطبيب أو الصيدلي عن مزيد من المعلومات حول الآثار الجانبية للدواء. إذا لاحظت أن أيًا من الآثار الجانبية قد أصبحت جسيمة، أو إذا لاحظت ظهور أي أعراض جانبية تم ترد في هذه النشرة، فيجب أن تعلم الطبيب أو الصيدلي.

للاإحاطة بالآثار الجانبية

رقم الهاتف: ٠٦-٥٣٣٠٠٠
www.jfda.gov
الموقع الإلكتروني: Jordan fda
تطبيق الهواتف الذكية: fda yellow card
نموذج الإبلاغ الورقي:

الإفراط في الجرعة،

إذا تناولت جرعات أكثر من ما يجب من مونتيلوكاست ف عليك مراجعة الطبيب فوراً طلباً لشورته. لم يتم تسجيل حدوث أية آثار جانبية في غالبية البلاغات التي تضمنت حالات الإفراط في الجرعة. تضمنت التحريش الأخطر حدوثاً والتي تم تسجيل وقوعها في حالات فرط الجرعة في البالغين والأطفال، الشعور بألم في البطن والتعاس والمعلش والصداع والتقيؤ وقرط النشاط.

الخصائص الدوائية،

خصائص ديناميكية الدواء

مونتال **للاطفال** (مونتيلوكاست الصوديوم) هو مضاد استنشقات الليكورتراين حيث يعمل على إحباط المواد المسماة بالليكورتراينيات، وهي الليكورتراينيات ضيقاً وتورماً في ممرات الهواء في الرئة كما يسبب أيضاً أعراض حساسية، وبواسطة إحباط الليكورتراينيات، فإن **مونتال** **للاطفال** يعمل على تحسين أعراض الربو ويساعد في السيطرة على الربو وكذلك تحسن أعراض الحساسية الموسمية (المسماة أيضاً بحمى القش أو التهاب الأنفي والموسمي)

خصائص حركية الدواء

الامتصاص: يمتص مونتيلوكاست بسرعة بعد تناوله عن طريق الفم.
التوزيع: ترتبط نسبة ٦٩٩ من مونتيلوكاست ببروتينات البلازما، ويتراوح حجم التوزيع في مرحلة الطفولة بين ٨ - ١١ لتر.
الطرح: يتم التخلص بسرعة الطرد من البلازما ٤٥ مل/ دقيقة في الفرد البالغ السليم. مونتيلوكاست و نطاظره تفرط عن طريق الصفراء بصورة شبه حصرية.

ظروف التخزين،

لا تحفظ الدواء في درجة حرارة أعلى من ٣٠°م.

إن هذا دواء

- دواء: يستعمل بوتر على شكله، مع استشارة خلافا لتعليمات الطبيب مع مرضى الكلى.
- نوع ومدة وصفة طبية وطريقة استعمالها: وصفة طبية، وتعليمات الصيدلاني التي مرصها لك.
- إن الطبيب (الصيدلي) ما هو الطبيب (الدواء) ومنتصفه ومورد.
- لا تلتصق يدك بالعلاج المعبأة قبل من قاطب نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- أحفظ الدواء بعيداً عن شتات الأطفال.

مركز جراحة العصبية العرب
إعداد: المصفاة العرب

PHARMA
Total Quality
www.tqpharma.com

شركة القضاء للصناعات الدوائية - عمان - الأردن